

## NOTFALLMEDIKAMENTE

### Abciximab

Reopro®, 5 ml enthalten 10 mg

Glykoprotein IIb/IIIa Rezeptorantagonist

Indikation: Akutes Coronarsyndrom (ACS), PTCA

Dosierung Bolus: 0,25 mg/Kg, danach

**PERFUSOR:** 0,125 mcg/kg/min. Zubereitung:  
4,5 ml auf 50 ml NaCl 0,9%.

Übliche Gabe: 2,1 - 3,4 ml/h

KI

Schwangerschaft und Stillzeit, orale  
Antikoagulation mit INR >1,5, bekannte  
Thrombozytopenie von < 100 G/l

Bemerkung: Therapiedauer maximal 24 h vor und 12 h  
nach PTCA.

**NW:** Blutungen, Thrombocytopenie,  
allergische Reaktionen

### Acetylsalicylsäure

Aspisol®, 5ml = 0,5 g

Thrombozytenaggregationshemmer

Indikation: Akutes Coronarsyndrom (ACS)

Dosierung 160-325 mg i.v.

KI

Allergie. CAVE: hämorrhagische Diathese, GI-  
Ulzera, Asthma, Reye-Syndrom

Bemerkung: **NW:** allergische Reaktionen